



# MISOPROSTOL

## Doses recomendadas 2012

800µg	<b>Aborto induzido<sup>1</sup></b> 800µg pv ou sl a cada 3h (máx x3 en 12h) <sup>a</sup>			<b>Tratamento da HPP</b> 800µg sl dose única <sup>f</sup>
	<b>Aborto retido</b> 800µg pv a cada 3h (máx x2)			
600µg	ou 600µg sl a cada 3h (máx x2) <sup>b</sup>			<b>Profilaxia da HPP<sup>2</sup></b> 600µg po dose única <sup>e</sup>
	<b>Aborto incompleto<sup>2,3</sup></b> 600µg po dose única <sup>a</sup> ou 400µg sl dose única <sup>a</sup>			
400µg	<b>Maduração cervical pré-instrumentação</b> 400µg pv 3 h ou sl 2–3h antes do procedimento <sup>a</sup>	<b>Aborto induzido<sup>1,4</sup>/ Interrupção da gravidez</b> 400µg pv ou sl a cada 3h (máx x5) <sup>a</sup>		
	200µg	<b>Morte fetal intrauterina<sup>4</sup></b> <b>13–17 semanas</b> 200µg pv a cada 6h (máx x4) <sup>c</sup>		
100µg	<b>Morte fetal intrauterina<sup>4</sup></b> <b>18–26 semanas</b> 100µg pv a cada 6h (máx x4) <sup>c</sup>			
25µg			<b>Morte fetal intrauterina<sup>5</sup></b> 25µg pv a cada 6h ou 25µg po a cada 2h <sup>d</sup>	
			<b>Indução de parto<sup>2,5</sup></b> 25µg pv a cada 6h ou 25µg po a cada 2h <sup>d</sup>	
		<b>Cuidado com cicatriz uterina prévia e com cesárea</b>		
	<b>Primeiro Trimestre</b>	<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Terceiro Trimestre</b>	<b>Pós-Parto</b>

Consulte atualizações em [www.figo.org](http://www.figo.org)

### Notas

- 1 Para uso onde é legalizado, e com mifepristone, onde esteja disponível
- 2 Incluído na Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da OMS
- 3 Esperar por 1–2 semanas para que tenha efeito, exceto em caso de sangramento excessivo ou infecção
- 4 Reduzir as doses pela metade em caso de cesárea prévia ou outra cicatriz uterina
- 5 Assegurar-se de que utiliza a dose correta. Doses excessivas podem causar complicações. Não use em caso de cesárea prévia

### Referências

- a Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde – 2ª ed.2013
- b Gemzell-Danielsson et al. IJGO, 2007
- c Gómez Ponce de León et al. IJGO, 2007
- d Recomendações da OMS para indução do parto, 2011
- e Diretrizes FIGO: Prevenção da HPP com misoprostol, 2012
- f Diretrizes FIGO: Tratamento da HPP com misoprostol, 2012

**Abreviaturas:** pv via vaginal; sl via sublingual; po via oral; HPP hemorragia pós-parto; µg micrograma