



MISOPROSTOL

Posologie recommandée (2012)

800µg	Interruption de grossesse¹ 800µg PV <u>ou</u> SL toutes les 3h (x3 max entre 12h) ^a			Traitement de l'HPP 800µg SL en prise unique ^f
	Grossesse arrêtée 800µg PV <u>ou</u> 600µg SL toutes les 3h (x2 max) ^b			
600µg				Prévention de l'HPP² 600µg PO en prise unique ^e
	Avortement incomplet^{2,3} 400µg SL <u>ou</u> 600µg PO en prise unique ^a			
400µg				
	Préparation cervicale avant intervention endo-utérine 400µg PV 3h <u>ou</u> SL 2-3h avant l'acte ^a	Interruption de grossesse^{1,4} 400µg PV <u>ou</u> SL toutes les 3h (x5 max) ^a		
200µg		Mort fœtale in utero⁴ 13-17 SA 200µg PV toutes les 6h (x4 max) ^c		
100µg		Mort fœtale in utero⁴ 18-26 SA 100µg PV toutes les 6h (x4 max) ^c		
25µg			Mort fœtale in utero⁵ 25µg PV toutes les 6h <u>ou</u> 25µg PO toutes les 2h ^d	
			Déclenchement du travail^{2,5} 25µg PV toutes les 6h <u>ou</u> 25µg PO toutes les 2h ^d	
		Considération particulière pour utérus cicatriciel et césarienne		
	1er trimestre	2ème trimestre	3ème trimestre	Postpartum

Mises à jour disponibles sur www.figo.org

Notes

- 1 Uniquement dans le cadre légal et, si disponible, en association avec la mifépristone
- 2 Fait partie de la Liste modèle de l'OMS des médicaments essentiels
- 3 Laisser agir pendant 1-2 semaines sauf en cas de saignement excessif ou d'infection
- 4 Diminuer la dose par 2 en cas d'utérus cicatriciel
- 5 Attention à bien utiliser les doses préconisées. Un surdosage peut être source de complications. Ne pas utiliser en cas d'utérus cicatriciel

Références

- a OMS. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems (2nd edition), 2012
- b Gemzell-Danielsson et al. IJGO, 2007
- c Gómez Ponce de León et al. IJGO, 2007
- d WHO recommendations for induction of labour, 2011
- e Directives de la FIGO: Le misoprostol dans la prévention de l'hémorragie du postpartum, 2012
- f Directives de la FIGO: Le misoprostol dans le traitement de l'hémorragie du postpartum, 2012

Abréviations PV - voie vaginale; SL - voie sublinguale; PO - per os; HPP - hémorragie du postpartum; µg - microgramme.